



أحمد عبد المنعم رجب

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

استئصال الجراحي من نوع الأحداث ليفوم وعائي الثالث دون الانصمام قبل الجراحة.

طريقة البحث:

وبصرف النظر عن الحالة المتقدمة سيلان الأنف السائل النخاعي (CSF) intraoperatively هناك لم تكن كبيرة ولا المنطوق مضاعفات ما بعد الجراحة. تم إصلاح تسرب السائل النخاعي من خلال نفس النهج بنجاح في نفس المجموعة. كان ثمانية عشر مريضا إزالة الورم المتبقية كاملة مع عدم وجود تكرار أو خلال الفترة التي تراوحت متابعة من 6 أشهر إلى 10 سنة.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**البكتيرية ثقافات الصماخ الأوسط وغسل القصبات المزمن التهاب الأنف و الجيوب في.**

طريقة البحث:

وناقش دور البكتيريا في التهاب الأنف و الجيوب المزمن (CRS) لا تزال أقل والمعروف تأثيرها على الشعب الهوائية السفلى. كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على الأنواع البكتيرية الفردية في CRS وربط هذه البيانات الميكروبيولوجية مع النتائج السريرية والثقافات البكتيرية المرتبطة بها في الشعب الهوائية أقل. وشملت هذه الدراسة 25 مريضا المحتملين CRS المقرر إجراؤها في جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار وظيفية



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**دور الفطريات في مجرى الهواء التهاب الأنف و الجيوب المزمن من المرضى.**

طريقة البحث:

لا تزال تناقش الدور الذي تقوم به الفطريات لدى مرضى التهاب الأنف و الجيوب المزمن الأكثر باسم المستضد الهدف من الشروع في مثل هذه الالتهابات المزمنة. مع وجود التهاب مزمن في اليوزيني التهاب الأنف و الجيوب المزمن، ومن المتوقع رد فعل مبالغ فيه لمستضدات استنشاق المختلفة. وسوف يتم تأكيد دور الفطريات فقط عندما تظهر خلايا T داخل الجيوب الأنفية أن الاستجابة بفعالية لمستضدات الفطرية منقشف من الجيوب الأنفية ومع المتظاهرين الذين إزالتها سيوقف هذا المرض



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**دبابيس حادة وشاح لامع الرغامية القصبية جهات أجنبية: عرض والإدارة.**

طريقة البحث:

وشاح استنشاق دبوس يعتبر خطرا ثقافية في الشرق الأوسط الفتيات الصغار. وبالتالي فإن الهدف من هذا العمل هو دراسة العرض من استنشاق الهينات الهوائية الحاد الأجنبية (AFB) وإدارتها.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**تطويق المصرة رأب البلعوم: تقنية جديدة لعدم كفاية شراعي بلعومي.**

طريقة البحث:

العديد من التقنيات الجراحية المتاحة لعلاج القصور شراعي بلعومي (VFI). كل أسلوب له مضاعفات خاصة بها والأدوار غير الحيوية. لذلك كان الهدف من هذه الدراسة إلى تقديم رواية تقنية جراحية الفسيولوجية التي صممها صاحب البلاغ لإعادة بناء العضلة العاصرة في VFI شراعي بلعومي.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**والمحاكمة السريرية لعلاج الأوزون كعلاج لفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ.**

طريقة البحث:

المرضى البالغين خمسة وأربعين قدم مع فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، وتم تخصيصها بشكل عشوائي لتلقي إما دواء وهمي (15 مريضا) أو العلاج بالأوزون (لصناعة السيارات في haemotherapy؛ 30 مريضا). لعلاج هذه الأخيرة، كان يعالج 100 مل من دم المريض فورا مع حجم 1:1، خليط من غازي الأكسجين والأوزون (من مولد الأوزون) وإعادة حقنها في المريض عن طريق التسريب في الوريد. كانت تدار العلاجات مرتين أسبوعيا لمدة 10 جلسات. وسجلت البيانات التالية: قبل وبعد المعاملة يعني مكاسب السمع؛ الهواء والعظام المعدلات نغمة نقية؛ عتبات استقبال الكلام؛ عشرات التمييز الكلام، ومعدلات الاسترداد شخصي.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**والمحاكمة السريرية لعلاج الأوزون كعلاج لفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ.**

طريقة البحث:

المرضى البالغين خمسة وأربعين قدم مع فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، وتم تخصيصها بشكل عشوائي لتلقي إما دواء وهمي (15 مريضا) أو العلاج بالأوزون (لصناعة السيارات في haemotherapy؛ 30 مريضا). لعلاج هذه الأخيرة، كان يعالج 100 مل من دم المريض فورا مع حجم 1:1، خليط من غازي الأكسجين والأوزون (من مولد الأوزون) وإعادة حقنها في المريض عن طريق التسريب في الوريد. كانت تدار العلاجات مرتين أسبوعيا لمدة 10 جلسات. وسجلت البيانات التالية: قبل وبعد المعاملة يعني مكاسب السمع؛ الهواء والعظام المعدلات نغمة نقية؛ عتبات استقبال الكلام؛ عشرات التمييز الكلام، ومعدلات الاسترداد شخصي.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**هل التهاب العظم الغربالي القيحي هو سبب لالتهاب الجيوب الأنفية المعقدة بخراج تحت السمحاق المداري؟**

طريقة البحث:

وقد وصفت نظريات متعددة بشأن التسبب في التهاب الأنف و الجيوب العدوى المدارية في، ولكن ثبت توجد نظرية. يمكن فهم سبب المضاعفات تسمح إدارة عملها على نحو سليم. نحن التكهن بأن خراج تحت السمحاق المدارية (سبوا) الثانوية لالتهاب الأنف و الجيوب يشبه خراج تحت السمحاق المرتبطة التهاب العظم والنقي من العظام في جميع أنحاء الجسم. كان الهدف هو تقييم التغييرات العظمية من الجيوب الغربالية في المرضى الذين يعانون التهاب الأنف و الجيوب معقدة مع سبوا. تم إجراء هذه الدراسة على ثمانية المحتملين للمراقبة المرضى الذين يخضعون لجراحة بالمنظار الصرف الجيوب الأنفية التهاب الأنف و الجيوب لمع سبوا معقدة. وقد تم توثيق جميع الأعمار، وخصائص التصوير الشعاعي العظمي، والنتائج التشريحية المرضية. تم فحص عينات العظام الغربالية وتقييم histopathologically. وقد تم جمع تقيح من سبوا وإرسالها للثقافات. تقييم الكتاب العادي عينات العظام الغربالية اتخذت بالتنظير من الجدار الإنسي بعرقلة المحارة الفقاعي في المرضى السيطرة عشرة. كشف تحليل CT والنسجية التغييرات بما يتفق مع درجات عالية من التغييرات قيحي الغربالية العظام التهاب العظم. كانت المكورات العنقودية المخثرة إيجابية البكتيريا المستزرعة (62.5%) في سبوا. هذه النتائج تشير الى ان خراج تحت السمحاق ويعزى المدارية في المرضى الذين يعانون التهاب الأنف و الجيوب لنشر الصفوف العليا من التهاب العظم الغربالي العظمي الجيوب الأنفية قيحي. المكورات العنقودية الذهبية هي البكتيريا الأكثر شيوعا المشاركة مثقف. التهاب العظم العظمية في المرضى الذين يعانون التهاب الأنف و الجيوب مع سبوا مشابه سريريا و histopathologically في طابعها والسلوك إلى التهاب العظم والنقي من العظام في جميع أنحاء الجسم مع خراج تحت السمحاق المرتبطة بها.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**ليزر ثاني أكسيد الكربون بمساعدة الغضروف إعادة تشكيل التجميلية: تقنية جديدة لأذان بارزة.**

طريقة البحث:

وشارك ستة عشر مريضا مع 32 آذان بارزة مستقبلا. أجريت التبخر يزر ثاني أكسيد الكربون من سمك perichondrium وجزئية لسطح الغضروف الإنسي من الأذن وزوج من شقوق موازية ليزر على خطوط scaphal وكونتثال. تم إصلاح الغضروف مع الغرز للامتصاص فراش Vicryl. تمت دراسة التركيبة السكانية والنتائج بعد العملية الجراحية المبكرة والمتأخرة، والمرضى / رضا الوالدين والأطباء في متابعة.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

نظرة عامة على مشروع سوزي الأمن بعد السنوات الأربع الأولى من النشاط.

طريقة البحث:

تم تأسيس "صندوق سوزي" التسجيل، وجمع DG SANCO المشروع المشترك التي تمولها بيانات عن الاختناق في جميع دول الاتحاد الأوروبي وخارجها، من أجل إنشاء نظم لترصد الإصابات بحالات اختناق قادرة على توفير لمحة لتحليل المخاطر لكل من المنتجات مما تسبب في الإصابة. واستأنفت النتائج الرئيسية بعد 4 سنوات من أنشطة هنا.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**اللعب في الجهاز التنفسي الهضمي العلوي: أدلة جديدة على المخاطر من دراسة لصندوق سوزي.**

طريقة البحث:

جسم غريب (الفييس بوك) استنشاق، والطموح أو الابتلاع هي أحداث شائعة نسبيا في الأطفال. على الرغم من الجهود الكثيرة التي في عدة بلدان لتحقيق مستويات مقبولة السلامة للمنتجات الاستهلاكية المخصصة للأطفال، الألعاب الصغيرة أو أجزاء لعبة ما زالت تكرر ذكرها فيما بين الهيئات الأجنبية محفوفة بالمخاطر. والهدف من هذه الدراسة هو تحديد خصائص خطر حدوث مضاعفات والعلاج في المستشفيات لفترات طويلة بسبب طموح اللعب أو الاستنشاق أو الابتلاع وفقا للسن والجنس من المرضى، وخصائص الفييس بوك، ملابس الحادث، والخارجة من قلم المحكمة الآمن سوزي. بدأ التسجيل سوزي خزنة في عام 2005 لجمع البيانات لتكون بمثابة أساس لنشاط حماية المستهلك القائم على المعرفة. هو في الواقع واحدة من أوسع قواعد البيانات جمع الإصابات جسم غريب في المسالك الهوائية الهضمي العلوي في طب الأطفال المرضى. تميزت به من قبل توصيف عميق للكائنات التي تسبب في إصابات لمراقبة الجودة ومتعددة الخطوات العملية التي تضمن موثوقيتها. استراتيجيات وقائية موجهة فرض تنظيم الإنتاج الصناعي، حتى لو الأساسية، ليست كافية وتحتاج إلى أن تكون متكاملة مع غيرها من التدخل لجعل مقدمي الرعاية على علم باتجاه المراقبة المناسبة للأطفال.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

### اصابات الجسم الغريب الغير الغذائية.

طريقة البحث:

هذه الدراسة تستخدم البيانات المقدمة من المشروع SUSY الآمن، و SANCO DG التعاون الممولة من المشروع الذي يهدف إلى جمع البيانات العلمية وعدد ممكن من جهات أجنبية بشأن (الفييس بوك) إصابات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 0-14 سنة وتكون أساسا لنشاط حماية المستهلك القائم على المعرفة في أوروبا في السوق. وتميزت FBS بواسطة الشكل والحجم والاتساق. تم حساب الإحصاء الوصفي (العدد المطلق والنسبي أو متوسط، وأنا والربع الثالث وفقا لمتغير القاطع أو المستمر، على التوالي) لكل الخصائص البند تعتبر غير الغذائية؛ الفييس بوك يتميز التوزيع حسب العمر فئة الأطفال وموقع عرقلة تم تقييم. واعتبرت نتيجتين مختلفتين: دخول المستشفى والمضاعفات. وقد تم تحديد FBS التي في أغلب الأحيان يسبب مضاعفات. تم حساب الارتباط بين الأطفال في سن، وجود الكبار، وخصائص الكائن والنتائج باستخدام نسب الأرجحية الخام وما يتصل بها من فترات الثقة 95%.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**إصابات الغذاء جسم غريب.**

طريقة البحث:

الآمن، في SUSY بدأ يشارك في مشروع ممول هذه الدراسة يستخدم البيانات المقدمة من المشروع DG SANCO فبراير 2005، والذي يهدف إلى إنشاء سجل دولي لحالات جهات أجنبية (الفييس بوك) إصابات في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 0-14 سنة. تم تنفيذ التحليل على الإصابات بسبب مادة غذائية. وذكر موقع الفييس بوك وفقاً القصبية الهوائية (ICD933) والبلعوم والحنجرة (ICD932) والأنف (ICD931) رمز: أذان ICD9-CM  
تم تقييم الإصابة توزيعات العمر. (ICD935) والفم والمريء والمعدة (ICD934) والقصبية الهوائية والرئتين التي في FBS والجنس. كما تم تقييم البيانات المتعلقة إشراف من شخص بالغ النشاط وقبل الإصابة. وقد تم تحديد / أغلب الأحيان يسبب مضاعفات. تم حساب الارتباط بين الأطفال في سن، وجود الكبار، وخصائص الكائن والاستشفاء  
%. المضاعفات باستخدام نسب الأرجحية غير المرجح وما يتصل بها من فترات الثقة 95



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

**تقييم الالتزام البكتيرية وترتيبات البيوفيلم كأهداف جديدة في علاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن.**

طريقة البحث:

ويجري تطوير العديد من الأدوية المرشحة الواعدة التي تستهدف الالتزام البكتيرية وتشكيل بيوفيلم. لا يمكن الأدوية مثل الأمل أن تدرس في التهاب الأنف و الجيوب المزمن (CRS) دون تقييم معايير مثل الفوعة في أشكال مختلفة من هذا المرض مع وبدون الأنف المرجلات (CRSwNP و CRSsNP). كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الالتزام البكتيرية والاستجابة للمضادات الحيوية ودرجة تراكم الأغشية الحيوية البكتيرية وأهداف جديدة للعلاج في CRSsNP و CRSwNP. التحق مستقبلي عشرين مريضا CRS و 10 مواضيع عادية مع المحارة الهوائية الفقاعي عرقلة في هذه الدراسة. أجريت المجهر الإلكتروني والثقافات على عينات الأنسجة الأنفية الجيوب الأنفية. تم قياس الاختبارات البكتيرية باستخدام الانضمام لوحة الثقافة الأسلوب الأنسجة كيميا. وقد تم تحديد البكتيريا الملتصقة بقوة كبيرة في 6/9 (77%) حالات CRSsNP بالمقارنة مع 7/1 (14%) حالات CRSwNP. وقد تم تحديد البكتيريا الملتصقة بشدة التي كانت حساسة للسيبروفلوكساسين، فانكومايسين، و impenim في 75% من المكورات العنقودية إيجابية مثقف المخثرة. وقال إن ثمة فروق معنوية ( $P = 0.007$ ) في درجة تراكم الأغشية الحيوية البكتيرية بين المجموعتين. في CRSsNP، لوحظ وجود مرحلة أكثر تقدما من الأغشية الحيوية البكتيرية مع التقيد البكتيرية قوية مما يجعلها أهدافا جذابة لعقاقير جديدة. في CRSwNP، تم تحديد الأغشية الحيوية البكتيرية أقل مرحلة التصاق البكتيريا مع منخفضة، مما قد يساعد في تفسير انخفاض الفوعة البكتيرية في بيئة من الترتيبات، دون المستوى الأمثل التنظيمية



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2013/01/15

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تقييم الاختلافات السريرية و نمط الملف في حالة أورام الشوانومة الدهليزي وغيرها من الأورام زاوية المخيخية الجسرية.

طريقة البحث:

لتقييم الوضع السريري، ونمط الإحالة، والتأخر في التشخيص، وتأثير حجم الورم من الحالات التي تنطوي على schwannomas الدهليزي (VS) مقابل الأخرى الزاوية المخيخية الجسرية (CPA) أورام في الشعب المصري.