



كلية الطب

أحمد فتحي شيبه

اسم الباحث:

تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

**العلاج الجراحي لحالات التهابات الفقرات والغضروف ما بعد التدخل الجراحي باستخدام التثبيت الخلفى بشرائح
ومسامير مع تركيب اقفاص بيك**

طريقة البحث:

ان التهاب الفقرات والغضروف ما بعد الجراحة يتسبب بألم شديد فى الظهر والساقين مع عدم القدرة على الحركة وغالبا ما يتم العلاج بالراحة والمضادات الحيوية , هناك بعض من الحالات لا تستجيب للمضادات الحيوية وهى تحتاج للعلاج الجراحي وهذا ما تم باستخدام المسامير من الخلف عبر عنق الفقرة وقفص قطنى بين الفقرتين وتم استخدام هذه الجراحة بعد ما تم استخدام الراحة والمضادات الحيوية لمدة لا تقل عن شهرين وقد اثبتت الجراحة فعاليتها ونجاحها القادم مع عدم وجود مضاعفات ويوصى باستخدامها فى علاج مثل هذه الحالات.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

دراسة مقارنة للتثبيت الخلفى لكسور الفقرات الصدرية والقطنية باستخدام مسامير عبر عنق الفقرة لمسافة طويلة مقارنة بالتثبيت مع مسافة قصيرة

طريقة البحث:

كسور الفقرات الصدرية والقطنية يتسبب فى اصابات للأعصاب والنخاع بصورة سيئة ما لا يتم تثبيت الفقرات مع توسيع القناة العصبية وقد اجريت هذه الدراسة على 25 مريض مصابون بكسور الفقرات الصدرية والقطنية حيث تم علاج 10 حالات بالتثبيت من الخلف لمسافة قصيرة باستخدام 4 مسامير وشريحتين وهناك 10 حالات تم تثبيتهم باستخدام 8 مسامير وشريحتين مع توسيع القناة العصبية من الخلف مع مقارنة النتائج تبين انه لا فرق بين المجموعتين ويوصى باستخدام التثبيت لمسافة قصيرة حيث اوفر فى الوقت والجهد .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

المعالجة الجراحية لازالة الضغط على النخاع الشوكي الغير ناتج عن إصابة

طريقة البحث:

تم إجراء هذه الدراسة علي الحالات التي يحدث فيها ضغط علي النخاع الشوكي نتيجة أورام في الفقرات أو النخاع الشوكي أو نتيجة التهابات أو خراج حول النخاع الشوكي أو أي سبب آخر غير ناتج عن إصابة نتيجة حادث وقد تم إجراء الجراحة اللازمة لهذه الحالات وتم متابعة الحالات بعد الجراحة ومتابعة مدي التحسن الحادث في الجهاز الحركي أو الحسي ومدي التحسن في القدرة علي التحكم في الإخراج



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

تقييم التدخل الجراحي الأمامي لمعالجة اصابات الفقرات القطنية

طريقة البحث:

ان اصابات الفقرات القطنية المرضية الناتجة عن كسور واصابات الناتجة عن ضعف وضغط وتآكل جسم الفقرة نتيجة التهابات واورام تتسبب في الضغط على الاعصاب من الامام ولهذا فأن التدخل الجراحي من الامام باستخدام استئصال جسم الفقرة المريضة وازالة الضغط على القناة العصبية مع وضع قفص قطنى وشريحة مثبتة بمسامير من الاعلى الى الاسفل مع وضع شظايا عظمية وقد اجريت هذه الجراحة على 12 مريض من مستشفى جامعة المنوفية وقد نجحت هذه الجراحة في تحسين حالات المرضى في المتابعة.



تاريخ اعتماد تسجيل البحث:

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

دور التثبيت بمسامير عبر عنق الفقرة في علاج تزحزح الفقرات القطنية الضموري

طريقة البحث:

تمت الدراسة في مستشفى جامعة المنوفية علي مرضي التزحزح الفقاري القطني باستخدام مسامير عبر عنق الفقرة مع وضع قفص بين الفقرتين مع استئصال المفصل القطني البرزخي بين الفقرتين وتوسيع جزور الاعصاب وقد أجريت هذه الجراحة علي 12 مريض ومع متابعة الحالات لمدة عامين تبين تحسن في الحالة المرضية مع وجود انصهار عظمي كافي بين الفقرتين المتزحزحتين ويوصي باستخدام التثبيت من الخلف بمسامير عبر عنق الفقرة في حالات التزحزح الفقاري القطني



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: أكاديمي

عنوان البحث:

دراسة مقارنة بين تثبيت الفقرات القطنية من الخلف باستخدام مسمار عبر عنق الفقرة مع انصهار عظمي بين النتوء المستعرض وبين الانصهار بين جسم الفقرتين باستخدام قفص بيك في حالة تزحزح الفقرات القطنية والبرزخية .

طريقة البحث:

وقد اجريت هذه الدراسة على 20 مريض ، 10 مريض باستخدام التثبيت بمسامير عنق الفقرة مع انصهار عظمي بين النتوء المستعرض وقد تحسنت الحالات باستخدام المسامير عبر عنق الفقرة مع انصهار عظمي بين النتوء المستعرض واستخدام مفصل قطنى بين الفقرتين من حيث الحالة الاكلينيكية ومن حيث الانصهار العظمي .



تاريخ اعتماد تسجيل البحث: 2012/11/14

نوع البحث: تطبيقي

عنوان البحث:

دور التثبيت بمسامير عبر عنق الفقرة في علاج تزحزح الفقرات القطنية الضموري

طريقة البحث:

تمت الدراسة في مستشفى جامعة المنوفية علي مرضي التزحزح الفقاري القطني باستخدام مسامير عبر عنق الفقرة مع وضع قفص بين الفقرتين مع استئصال المفصل القطني البرزخي بين الفقرتين وتوسيع جزور الاعصاب وقد أجريت هذه الجراحة علي 12 مريض ومع متابعة الحالات لمدة عامين تبين تحسن في الحالة المرضية مع وجود انصهار عظمي كافي بين الفقرتين المتزحزحتين ويوصي باستخدام التثبيت من الخلف بمسامير عبر عنق الفقرة في حالات التزحزح الفقاري القطني